AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP16-9-77476129

BULLETIN STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

ABONNEMENT ANNUEL:

Régisseur de recettes de la D.D.A. C.C.P. Montpellier 5238-57

50 francs

nº 25 - 15 septembre 1977

OLIVIER

Mouche de l'olive : Le vol de dacus se développe depuis le 9 septembre, notamment dans le Gard (St Bonnet et région de Nîmes). Il débute à St Jean-de-la Blaquière (ouest de l'Hérault) et se poursuit au nord-est de Montpellier.

Rappelons l'intérêt des traitements localisés sur la face ensoleillée des arbres à l'aide du mélange hydrolysat de protéines (Buminal) et de fenthion. Cette méthode est préconisée

dès l'apparition des premières mouches

Mouche de l'olive : Le 701

Gard (

(ouest de l'Hérault) et se
Rappelons l'intérêt des tr
du mélange hydrolysat de p
dès l'apparition des premi
Actuellement nous semblons
Aussi la lutte est recomms
(nord-est de Montpellier)
Gard et l'Aude;
L'insecticide est à choisi
fenthion (50 g M.A./hl); c
phosphamiden (30 g M.A./hl)

Le délai d'application ave
observé.

Aussi le traitement ne pet
récolte est envisagée au c
En revanche, les picholine
huile. Actuellement nous semblons entrer dans la phase dont dépendra la qualité de la récolte 1977 à Aussi la lutte est recommandée dans les olivettes où quelques fruits véreux ont été observés (nord-est de Montpellier) et doit être étendue dans la zone occidentale de l'Hérault, le

L'insecticide est à choisir parmi une des matières actives suivantes :

fenthion (50 g M.A./hl); diméthoate (30 g M.A./hl); formothion (40 g M.A./hl); phosphamiden (30 g M.A./h?).

Le délai d'application avant récolte est de 21 jours pour l'olive. Il sera strictement

Aussi le traitement ne peut être appliqué actuellement sur la variété Lucques dont la récolte est envisagée au cours de la deuxième quinzaine de septembre. En revanche, les picholines plus tardives devront être protégées, ainsi que les variétés à

ARBRES FRUITTERS

Cératite : Activité faible du ravageur. Des prises par ailleurs peu nombreuses demeurent localisées dans la plaine du Roussillon?

> L'INGENIEUR EN D'AGRONOMIE. CHEF CHEF DE CIRCONSCRIPTION.

> > V. LAGAUDE

Tirage du 15 septembre 1977 - 1 400 exemplaires.